


副反応はあるの？

- ▶ 接種当日に起こる重い副反応として、まれにアナフィラキシー症状が起こる可能性があるため、お子さんの様子を十分に観察してください。
- ▶ 接種後1～2週間間に、腸重積症の発生リスクが通常より高まるとする報告もあります。

腸重積症はロタワクチン接種の有無に関わらず、小さいお子さんがかかり得る病気です。

腸重積症ってなに？（1）

- ▶ 口側の腸壁が、肛門側の腸壁に“はまり込む”病気です。
- ▶ 重なった部分の血流が滞り、悪化するとその部分が壊死して腹腔（おなかの中の空間）に細菌が侵入することで重篤な感染症（腹膜炎）を引き起こします。



口側の腸が肛門側の腸に“はまり込む”

腸重積症ってなに？（2）

- ▶ 3か月～2歳未満のお子さんによくみられる病気です。
 - ▶ 症状…腹痛が出たり治まったりを繰り返す、嘔吐、いちごジャム状の血便、ぐったりして顔色が悪くなる など
- ➔ 腹痛を訴えることができない赤ちゃんでは、急に機嫌が悪くなることを繰り返したりします。

こうした症状のほか、「いつもと何か違う」と感じたら医療機関にご相談ください。

腸重積症のリスクを減らすには？

- ▶ ロタワクチン接種の有無に関わらず、月齢が進むにつれて腸重積症の発生頻度は高くなります。
- ▶ そのためロタワクチンの初回接種は、腸重積症の発生頻度が比較的低い**生後14週6日**までに終える必要があります。
- ▶ 15週以降の初回接種は安全性の面から推奨されていません。

必ず期限内に接種を受けましょう！！